甘藷優良品種圖譜

徐慶鍾

TARI LIB.
C001853

台灣省農業試驗所圖書館

臺灣省農業試驗所嘉義農業試驗分所

中華民國四十一年十二月編印

臺灣新生……印

434.5
4039

甘藷優良品種圖說

目　次

序……………………………………………………………………………1
圖一：臺農三號……………………………………………………………2
圖二：臺農九號……………………………………………………………4
圖三：臺農十號……………………………………………………………6
圖四：臺農十六號…………………………………………………………8
圖五：臺農十七號…………………………………………………………10
圖六：臺農十九號…………………………………………………………12
圖七：臺農二十五號………………………………………………………14
圖八：臺農二十六號………………………………………………………16
圖九：臺農二十七號………………………………………………………18
圖十：臺農三十一號………………………………………………………20
圖十一：臺農四十三號……………………………………………………22
圖十二：臺農四十四號……………………………………………………24
圖十三：臺農四十五號……………………………………………………26
圖十四：K2…………………………………………………………………28
圖十五：C 137………………………………………………………………30
圖十六：C 162………………………………………………………………32
圖十七：南瑞蕃（Nancy Hall）……………………………………………34
圖十八：普利蕃（Porto Rico）……………………………………………36
附錄一：甘藷優良品種特性檢索表…………………………………………38
二：鑑別各品種主要特徵一覽………………………………………………39
三：甘藷優良品種產量及品質比較表………………………………………40

農試所藏書
分類 53
編號 1
保管 圖
贈
臺灣省農業試驗所圖書館
001853

序

本分所從事甘藷育種事業，迄已卅週年，先後育成雜交新品種多種，現仍在繼續進行中。歷年來本省推廣品種，農家栽培品種，大都爲本分所所育成；此項品種特性，無論是已推廣多年的舊品種，或是正在推廣的新品種，從事推廣工作的指導人員，或是實地栽培的農家似乎都需要瞭解。

光復前推廣獎勵而現在仍在栽培的品種，如台農三號、九號、十號、十六號、十七號、十九號、廿五號、廿六號、廿七號和卅一號等，光復後，經過區域試驗，正在推廣中的台農四三號、四四號、四五號以及新引進的外來品種，南瑞苕、普利苕、和新育成尚在區域試驗中，即將推廣的K2、C137、C162等，都是本省現在栽培的優良品種。這許多推廣中的台農種，一部分多年來未曾換種，諸多退化混雜，急待選種、淘汰、更新。

汰劣留良，不得不瞭解這許多品種的原有特性；推廣新品種，也得明瞭新品種的特性。關於甘藷品種的特性，固多文字記載，可供參攷，然而總不及實物或圖片來得簡便，一目瞭然。每與各縣鄉鎮指導人員或篤農家接觸，多謝他們的熱忱，輒有請編甘藷優良品種圖譜之議。本分所爲應各方要求，使大家明瞭甘藷優良品種特性，經農藝系主任楊景潘先生，特就已經推廣的台農種及新引進的，或新育成的品種，選出十八種，將其特能代表形態特性部分，由盛惠泉先生繪圖，編印成册，列爲本分所推廣指導手册之一，以供各縣從事甘藷推廣工作的鄉鎮指導人員和實地栽培甘藷的篤農家選種留種時參考之用。

此項圖譜，最好用彩色印刷，因爲各品種間，諸多形態特性是憑顏色來區別的，但限於財力和印刷條件不夠，一時還不能如願，祇有希望將來吧！

中華民國四十一年十二月　　　楊　致　福

(一) 圖一說明

1. 品種名： **臺農三號**

2. 來　源： 親本為站×美國黃皮，民國十一年（1922）交配，十七年（1928）選出。

3. 特　徵： 塊根下膨短紡錘形，表面有縱溝，外皮粗糙，皮色深紫紅肉色黃，莖匍匐，色紫紅，多細毛，頂葉色，淡紫綠色，葉戟形，缺刻三淺裂，葉下面葉脉基部深紫紅色。

4. 特　性： 製簽率高，早熟，適於砂質壤土栽培，生育期間大約五足月，故宜於短期輪作，本省南部多利用為糊仔作及甘蔗間作品種。塊根產量每公頃為24,467公斤，過去競賽會之最高記錄為嘉義縣水上鄉，每公頃收穫塊根 62,259.6 公斤，製簽達 18,299 公斤，製簽率 35.27 %。

圖一：臺農三號



（二） 圖二說明

1. 品種名： **臺農九號**

2. 來　源： 親本爲接芋×南瑞蕃（Nancy Hall），民國十一年（1922）交配，十七年（1928）選出。

3. 特　徵： 塊根上膨紡錘形，外皮光滑，白色帶紫斑，肉色黃，莖匍匐，多毛茸，深黃綠色，頂葉黃綠，葉心臟形，具波狀齒，下面葉脉基部色淡黃綠。

4. 特　性： 中熟，蔓粗，葉厚，生長旺盛，具有父本南瑞蕃之特性，莖葉宜作家畜飼料。每公頃生藷收量爲28,378公斤，最高產量在嘉義縣東石區，每公頃生藷71,589.6公斤。性耐鹽，能抗霜害，沿海鹽鹹地方，可以栽培，前臺南縣農事試驗場，曾作鹹土試驗，收量每公頃達41,226.6公斤。

圖二：臺農九號



（三） 圖三說明

1. 品種名： **臺農十號**

2. 來　源： 親本爲美國黃皮×紅皮，係民國十一年（1922）雜交，十七年（1928）選出

3. 特　徵： 塊根長紡錘形，表皮光滑，淡黃白色，帶淡紫斑，肉色黃。莖匍匐性，深紫紅色，多毛茸。葉心臟形，全緣，下面葉脈基部深紫紅色；頂葉紫綠色。

4. 特　性： 晚熟，產量特多，是食用及飼料用之優良品種，全省均可栽培。每公頃生藷收量28,786公斤，前臺中農事試驗場夏作曾收 28,760.40 公斤（47,934 台斤）冬作收 36,588 公斤（60,948 台斤），嘉義東石朴子試驗地收 36,220 公斤（60,368 台斤），鹼土試驗地爲 33,069 公斤；臺南新化鎮山上莊於生產競賽會每公頃收穫量高達 87,316.2 公斤（145,527 台斤），爲本省甘藷產量之最高記錄。

圖三： 臺 農 十 號



(四) 圖四說明

1. 品種名： 臺農十六號

2. 來　源： 親本爲紅肉×與那國赤，係民國十三年(1924)交配，十九年（1930）選出。

3. 特　徵： 塊根長紡錘形，外皮稍光滑，色紫紅；肉色淡黃，有時帶有稀少紫斑。莖匍匐性，紅紫色，毛茸少，頂葉黃綠色。葉戟形，具波狀齒，下面葉脉基部深紫色。

4. 特　性： 較臺農十號稍早熟，豐產，澱粉含量高；每公頃生藷收量25,302公斤，澱粉價爲29.19％，栽培於埴質壤土，可獲良好成績。高雄縣旗山區南隆農場二年平均最高產量每公頃收穫達43,906.8公斤(73,178台斤)，普通平均產量爲25,302公斤。本品種在花蓮，臺東地方栽培較多。

圖四： 臺農十六號



（五） 圖五說明

1. 品種名：　臺農十七號

2. 來　源：　親本爲紅肉×餅藷，民國十三年（1924）交配，十九年（1930）選出。

3. 特　徵：　塊根紡錘形，外皮粗糙，紫紅色，肉色白。莖匍匐，深黃綠色，毛茸少。頂葉黃綠，葉形缺刻三淺裂，有時似鼻形，下面葉脉基部深紫紅色。

4. 特　性：　中熟，製簽率高，故澱粉價亦高；食味佳，豐產，每公頃23,143公斤。本省各地已普遍栽培，尤以埴質壤土之水田地帶，最爲適宜，本省中南部常用爲夏作品種。最高產量在臺南曾文區，每公頃生藷達 56,332.8公斤。

圖五：臺農十七號



(六) 圖六說明

1. 品種名： **臺農十九號**

2. 來　源： 親本爲白和蘭×美國黃皮，民國十四年(1925)交配，二十年(1931)選出。

3. 特　徵： 塊根紡錘形，外皮粗糙，淡橙黃色，肉色淡黃。莖匍匐，深紫紅色，毛茸多。頂葉黃綠，葉戟形，缺刻三深裂，下面葉脉基部淺黃綠色。

4. 特　性： 中熟，有耐鹽特性，在本省中南部栽培成績優良，沿海鹽分土壤地帶，栽培本品種，生育良好。生藷產量每公頃平均23,568公斤，最高(高雄縣旗山) 58,066.2公斤(96,777台斤)。

圖六： 臺農十九號



（七） 圖七說明

1. 品種名： **臺農二十五號**

2. 來　源： 親本爲美國黃皮×白和蘭，民國十五年(1926)交配，二十六年（1937）選出。

3. 特　徵： 塊根下膨短紡錘形，皮淡黃色，肉色淡黃。莖匍匐，黃綠色，有毛茸，頂葉黃綠，葉形五深裂掌狀，下面葉脈基部淡黃綠色。

4. 特　性： 中熟，耐旱，宜於南部雨水稀少山地栽培，具有豐產特性，每公頃生藷可產26,137公斤，最高產量（高雄縣旗山）達50,646公斤（84,410台斤）。

圖七： 臺農二十五號



（八） 圖八說明

1. 品種名： **臺農二十六號**

2. 來　源： 親本爲白和蘭×南瑞苕（Nancy Hall），民國十六年（1927）交配，二十六年（1937）選出。

3. 特　徵： 塊根紡錘形，皮色淡紫橙黃，肉色黃。莖匍匐，淡紫綠色，毛茸中。頂葉黃綠，葉心臟形，葉片橫短，間有波狀齒，下面葉脉基部深紅紫色。

4. 特　性： 早熟種，莖葉繁茂，適於間作，與臺農三號同，可用作糊仔栽培品種，澱粉價高，品質良，食味佳，每公頃生藷產量 23,017 公斤，製簽率 38.12 %，最高可達 32,124 公斤，澱粉價 28.53 %，平均產量，每公頃 23,017 公斤，高雄農事試驗場試驗記錄，每公頃收量爲 26,435.4 公斤，製簽率高達 42.70%。

圖八： 臺農二十六號



（九） 圖九說明

1. 品種名： **臺農二十七號**

2. 來　源： 親本爲美國黃皮×白和蘭，民國十六年(1927)交配，二十六年 (1937) 選出。

3. 特　徵： 塊根紡錘形，外皮粗糙，橙黃色，肉色淡黃。莖匍匐，色黃綠而有紫紅色斑條，毛茸少。頂葉深綠，葉片缺刻三深裂，下面葉脈基部紫紅色。

4. 特　性： 中熟，澱粉價高，塊根着生最早，味佳，每公頃生藷產量 23,500.6 公斤，民國二十九年每公頃曾收穫生藷36,103.8公斤，製簽百分率36.6%，澱粉價高達28.568%，各地栽培成績均佳。前高雄農事試驗場曾有每公頃產量 34,471.8 公斤 (57,453台斤)， 製簽率 38.6% 之良好成績。

圖九： 臺農二十七號



（十）圖十說明

1. 品種名：　**臺農三十一號**

2. 來　源：　親本爲白和蘭×元地，民國十八年（1929）交配，二十六年（1937）選出。

3. 特　徵：　塊根圓筒形，皮深紫紅色，肉色白有淡紫斑暈。莖匍匐，色深綠，毛茸極少。頂葉全部紫綠，葉片缺刻爲掌狀五淺裂，下面葉脉基部深紅紫色。

4. 特　性：　晚熟，耐旱，適應性大，乾燥瘠地亦能豐收，六年平均每公頃收生藷25,396.7公斤（42,327台斤），製簽率33.55％。各地栽培均獲良好成績，尤以臺南，高雄產量最高，日據時代，本品種曾有「陸上水雷」之稱，可知其增產價值，現在南部已普遍栽培，北部情形亦佳，高雄農事試驗場紀錄每公頃產生藷 32,241.6公斤（53,736台斤），競賽會最高產量每公頃達59,037公斤。

圖十：臺農三十一號



(十一) 圖十一說明

1. 品種名：　**臺農四十三號**

2. 來　源：　親本爲冲繩一號× Celebes 黃，民四二十四年(1935)年交配，三十三年 (1944) 選出。

3. 特　徵：　塊根紡錘形，皮淡紅色，肉色淡黃有紫斑。莖匍匐，紫紅色，無毛茸。頂葉葉脉紫色，葉片缺刻五淺裂，下面葉脉基部深紫色。

4. 特　性：　中早熟性，豐產，生藷產量每公頃各地三年平均爲 29,244 公斤，栽培區域以臺東，嘉義，鳳山最爲適宜，臺東區農林改良場試驗記錄，每公頃高達 33,790 公斤。

圖十一：　臺農四十三號



（十二） 圖十二說明

1. 品種名： **臺農四十四號**

2. 來　源： 親本爲蕃種×臺農十四號，民國二十五年（1936）交配，三十三年（1944）選出。

3. 特　徵： 塊根楕圓形，外皮紅褐色，肉色淡黃。莖匍匐，紫紅色，無毛茸。頂葉葉脉紅色，葉片缺刻三深裂或五裂，下面葉脉基部紫色。

4. 特　性： 中早熟，豐產，製簽率高，生藷平均收量每公頃28,003公斤，栽培地區以臺北，臺中，臺東較爲適宜，臺東區農林改良場每公頃生藷產量爲35,380公斤製簽率平均爲34.43%。

圖十二： 臺農四十四號



（十三） 圖十三說明

1. 品種名： **臺農四十五號**

2. 來　源： 親本爲臙栄葉×臺農十四號，民國二十五年(1936)交配，三十三年 (1944) 選出。

3. 特　徵： 塊根下膨短紡錘形，外皮黃色帶紫斑，肉白色。莖匍匐性，帶紫綠色，無毛茸。頂葉葉脉綠紫色，葉戟形，葉緣具有波狀齒，下面葉脉基部紫色。

4. 特　性： 早熟性，適應力强，插植後成活率高，生育旺盛，抗病力强。生藷收量每公頃平均34,073公斤，較現在推廣之臺農三十一號爲高。臺東區農林改良場每公頃產量曾高達 41,160 公斤，澎湖分場每公頃產量亦有16,610 公斤，冠於其他品種。

圖十三： 臺 農 四 十 五 號



（十四） 圖十四說明

1. 品種名： K2

2. 來 源： 親本爲蕃種×臺農十四號，三十四年以前交配，光復後進行淘汰試驗及高級試驗三年，於卅九年選出，現正在地方試驗中，成績極佳。

3. 特 徵： 塊根下膨短紡錘形，黃白色，偶有紫斑，肉色白。莖匍匐性，細長，深紫色，有毛茸。頂葉綠色，微帶紫色，葉戟形或缺刻三淺裂，下面葉脉基部色深紫色。

4. 特 性： 中早熟性，藷形整齊，莖葉繁茂，生育旺盛，具有豐產特性，各地三年平均每公頃生藷產量爲 28,590 公斤，適應地區廣大，如臺北、臺東、嘉義、高雄、花蓮，均有良好成績，嘉義試驗紀錄，每公頃32,600公斤。

圖十四： K 2



（十五） 圖十五說明

1. 品種名： C 137

2. 來　源： 親本爲臺農十七號×臺農四十五號，係光復後於民國三十五年（1946）交配，四十年（1951）選出，現正在地方試驗中。

3. 特　徵： 塊根長紡錘形，外皮紫紅色，肉色白，有淺紫色斑暈。莖匍匐，深綠紫色，無毛茸。頂葉綠色，葉心臟形，下面葉脈基部深紫色。

4. 特　性： 中熟性，生育旺盛，產量特豐，本分所高級試驗紀錄三年平均每公頃可收生藷34,826公斤，四十年在全省各地舉辦區域試驗，八區平均產量每公頃爲28,092公斤，最高產量爲35,600公斤。故本品種在增加單位產量呼聲下，爲值得注意之一豐產品種。

圖十五： C 137



（十六） 圖十六說明

1. 品種名：　C162
2. 來　源：　親本爲臺農三十一號×臺農四十五號，係光復後民國三十五（1946）年交配，四十（1951）年選出，現正在地方試驗中。
3. 特　徵：　塊根下膨長紡錘形，有時具縱溝，外皮深紫紅色，肉淡黃白色。莖匍匐性，暗紫綠色，無毛茸。頂葉紫綠色，葉戟形五淺裂，下面葉脈基部深紫色。
4. 特　性：　中熟性，生育旺盛，豐產，質佳，三年平均產量每公頃爲31,897公斤，四十年在全省八地舉行區域試驗，平均26,264公斤，適應地區遍及新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、臺東各地。嘉義試驗紀錄，高達36,428公斤，與 C137 同爲值得注意之豐產品種。

台湾省農業試驗所 圖書館

圖十六： C 1 6 2



（十七） 圖十七說明

1. 品種名： **南瑞苕**（Nancy Hall； ナンシホール）

2. 來 源： 原爲美國優良品種，本分所於民國三十六（1947）年引進。

3. 特 徵： 塊根紡錘形，外皮粗糙，皮色淡黃橙，有褐色縱紋，肉色淡橙及橙黃色斑暈。莖粗匍匐性，綠色，多毛茸。頂葉綠色，葉心臟形，極肥大，全緣，下面葉脈基部深紫色。

4. 特 性： 中早熟性，藷形整齊，內部組織緻密，食味甜美，富含甲種維他命及澱粉，民國四十年每公頃生藷產量達24,480公斤，三年平均產量每公頃爲19,490公斤，製簽率 40.13 %，爲食用品種中之優良品種，宜在都市附近栽培。

圖十七： 南瑞苕（Nancy Hall）



（十八） 圖十八說明

1. 品種名： **普利菩** (Porto Rico； ポードリク)

2. 來　源： 原爲美國優良品種，於民國三十六年（1947）由本分所引進本省。

3. 特　徵： 塊根短紡錘形，外皮赤橙色，肉色淡赤橙，莖匍匐，紫色，多毛茸。頂葉周緣淡紫，葉戟形，有二、三波狀齒，下面葉脉基部深紫色

4. 特　性： 中早熟性，藷形整齊，肉質粘性，富含胡蘿蔔素，味極甜美，宜於烤食及加工用，適於都市附近栽培，爲優良食用品種，民國四十年每公頃生藷產量18,840公斤。三年平均產量每公頃 14,260 公斤，製簽率爲 36.17 %。

圖十八： 普利菩（Porto Rico）



附錄一： 甘藷優良品種特性檢索表

葉形	頂葉色	下面葉脉基部	莖色	莖毛茸	塊根形	皮色	肉色	斑暈	品種名稱
心臟形	綠脉紫紅	深紫紅	深紫紅	最多	長紡錘形	淡黃白色紫斑	黃白	無	臺農10號
	綠或脈紫	深紫	綠紫斑	無	長紡錘形	紫紅	白	紫色斑暈	C 137
	綠	深紫	綠	多	紡錘形	淡黃褐色斑條	淡橙	橙黃色斑暈	南瑞苕
心臟形間有波狀齒	淡黃綠	淡黃綠	深黃綠	多	上膨紡錘形	白帶紫斑	鮮黃	無	臺農9號
	黃綠	深紅紫	淡紫綠	中	紡錘形	鮮紫橙黃	黃	無	臺農26號
戟形三淺裂	綠脈淡紫	深紫紅	紫紅	多	短紡錘形下膨有縱溝	深紫	黃白	無	臺農3號
戟形波狀齒	綠脈淡紫	紫	綠極淡紫	極少	下膨短紡錘形	黃色帶紫斑	白	無	臺農45號
	綠緣淡紫	深紫	紫	多	紡錘形	紅橙	淡紅橙	無	普利苕
	黃綠	深紫	綠淡紫	少	長紡錘形	紫紅	淡黃白	略有紫斑	臺農16號
三淺裂似鼻形	黃綠	深紫紅	深黃綠	少	紡錘形	紫紅	白	無	臺農17號
三淺裂	綠脈紫	深紫	深紫紅	中	下膨短紡錘形	黃白有紫斑	白	無	K 2
三深裂或五裂	綠脈紫	紫紅	黃綠紅紫斑條	中	紡錘形	橙黃有紫斑	淡黃白	無	臺農27號
	綠脈紫紅	紫	紫紅	無	楕圓形	紅褐	淡黃	無	臺農44號
	黃綠	淡黃綠	深紫紅	多	紡錘形	淡橙黃	淡黃白	無	臺農19號
五淺裂	全紫綠	深紫紅	深綠	極少	圓筒形	深紫紅	白	淡紫斑暈	臺農31號
	全紫綠	深紫	暗紫綠	無	下膨長紡錘形	深紫紅	淡黃白	淡紫斑	C 162
	綠脈淡紫	深紫紅	紫紅	無	紡錘形	白淡紅紫紋	淡黃	中心紫斑	臺農43號
五深裂	黃綠	淡黃綠	黃綠	中	下膨短紡錘形	淡黃白	鮮黃	無	臺農25號

附錄二： 鑑別各品種主要特徵一覽

	品種名稱	塊根					莖			葉		
		形狀	皮色	肉色	斑暈	粗滑	姿勢	莖色	毛茸	葉形	葉脈基部色	頂葉色
臺農品種	臺農三號	下膨短紡錘有縱溝	深紫	黃	無	粗	匍匐	紫紅	多	戟形三淺裂	深紫紅	淡紫
	臺農九號	上膨紡錘形	白帶紫斑	鮮黃	無	光滑	匍匐	深黃綠	多	心臟形波狀齒	淡黃綠	淡黃綠
	臺農十號	長紡錘形	淡黃白色紫斑	黃	無	光滑	匍匐	深紫紅	多	心臟形	深紫	深紫紅
	臺農十六號	長紡錘形	紫紅	淡黃	稀有紫斑	中	匍匐	紅紫	少	戟形波狀齒	深紫	黃綠
	臺農十七號	紡錘形	紫紅	白	無	粗	匍匐	深黃綠	少	缺刻三淺裂似鼻	深紫紅	黃綠
	臺農十九號	紡錘形	淡橙黃	淡黃	無	粗	匍匐	深紫紅	多	缺刻三深裂	淡黃綠	黃綠
	臺農二十五號	下膨短紡錘形	淡黃白	淡黃	無	中	匍匐	黃綠	中	五深裂	淡黃綠	黃綠
	臺農二十六號	紡錘形	淡紫橙黃	黃	無	中	匍匐	淡紫綠	中	心臟形	深紅紫	黃綠
	臺農二十七號	紡錘形	橙黃	淡黃	無	粗	匍匐	黃綠紅紫斑條	少	缺刻三深裂	紫紅	綠脈紫
	臺農三十一號	圓筒形	深紫紅	白	淡紫斑暈	中	半直立	深綠	少	掌狀五淺裂	深紫紅	紫綠
	臺農四十三號	紡錘形	淡紅	淡黃	紫斑	光滑	匍匐	紫紅	無	五淺裂	深紫	綠脈紫
	臺農四十四號	楕圓形	紅褐色	淡黃	無	粗	匍匐	紫紅	無	三深裂或五裂	紫	紅色
	臺農四十五號	下膨短紡錘形	黃色帶紫斑	白	無	粗	匍匐	紫綠	無	戟形波狀齒	紫	綠脈紫
新品種	K 2	下膨短紡錘形	黃白有紫斑	白	無	中	匍匐	深紫紅	中	戟形三淺裂	深紫	綠紫
	C 137	長紡錘形	紫紅	白	紫色暈	中	匍匐	綠	無	心臟形	深紫	綠
	C 162	下膨長紡錘形	深紫紅	淡黃白	淡紫斑	粗	匍匐	暗紫綠	無	戟形五淺裂	深紫	紫綠
引進品種	南瑞苕	紡錘形	淡黃橙有褐色斑條	淡橙	橙黃色斑暈	粗	匍匐	綠	多	心臟形	深紫	綠
	普利苕	紡錘形	橙紅	淡紅橙	無	中	匍匐	紫	多	戟形波狀齒	深紫	綠緣紫

附錄三：　甘藷優良品種產量及品質比較表

品種名稱		塊根產量（公斤/公頃）	製簽率（%）	製簽量（公斤/公頃）	塊根最高產量（公斤/公頃）	鮮莖葉產量（公斤/公頃）	食味
臺農種	臺農三號	24,476	35.27	8,578	62,260	5,552	上　中
	臺農九號	28,378	32.73	9,283	71,590	13,870	上　下
	臺農十號	28,786	30.73	8,849	87,316	12,139	中　上
	臺農十六號	25,302	34.50	8,698	43,907	9,725	中　上
	臺農十七號	23,143	36.44	8,432	56,333	6,578	中　上
	臺農十九號	23,568	34.00	8,093	58,066	9,049	中　上
	臺農二十五號	26,137	35.35	9,304	50,646	13,546	上　下
	臺農二十六號	23,017	38.12	8,700	32,125	5,336	上　中
	臺農二十七號	23,500	36.60	8,567	36,104	10,675	上　下
	臺農三十一號	25,396	33.55	8,562	59,037	11,551	中　中
	臺農四十三號	29,244	32.90	9,679	33,790	14,021	中　上
	臺農四十四號	28,003	36.20	10,210	35,380	9,523	中　上
	臺農四十五號	34,073	31.40	10,738	41,160	8,253	中　上
新品種	K　2	28,590	31.41	8,980	32,600	6,990	中　中
	C　137	34,826	24.00	6,485	35,600	4,160	中　中
	C　162	31,897	28.00	8,190	36,420	7,600	中　下
引進品種	南瑞苕	19,490	40.13	7,821	24,480	6,540	上　下
	普利苕	14,260	36.17	5,158	18,840	4,280	上　上

TARI LIB.
C001853

434.315/4039　001853.
台灣省農業試驗所嘉義農業試驗分所
甘藷優良品种图譜
DATE DUE　BORROWER'S NAME

台灣省農業試驗所圖書館

434.315
4039
臺灣省農業試驗所
001853